

Prenacin

Laboratorios Farsiman <laboratorios@farsiman.com>

http://www.laboratoriosfarsiman.com/index.php?view=property&id=11&option=com_hotproperty

Prenacin®

Clomifeno Citrato 50 mg

Clase Terapeutica: Inductor de la Ovulación



Composición:

Cada tableta contiene: Clomifeno Citrato de 50 mg

Indicaciones

El Clomifeno se utiliza en el tratamiento de la infertilidad anovulatoria.

Posología

La dosis habitual por vía oral es de 50 mg/día durante 5 días, comenzando en, o cerca del, quinto día del ciclo menstrual o en cualquier momento si existe amenorrea. Si no se produce ovulación, se puede administrar una tanda de 100 mg/día durante 5 días, empezando 30 días después del anterior. Entre los ciclos de tratamiento las mujeres deben someterse a examen para detectar posibles embarazos o crecimientos de quistes.

Se recomienda hasta un total de 6 ciclos de tratamiento, si no se ha producido el embarazo en este período se recomienda discontinuar la terapia con Clomifeno.

Contraindicaciones

Está contraindicado en pacientes con enfermedad hepática y debe de considerarse el riesgo de toxicidad en pacientes con antecedentes de alteraciones hepáticas. No debe emplearse en pacientes con hemorragia uterina anormal no diagnosticada; no deben de tomarlo aquellas pacientes con tumores dependientes de hormonas y en aquellas con depresión mental preexistente o tromboflebitis, debido al riesgo de exacerbación.

Debe advertirse a la paciente acerca de la posibilidad de partos múltiples, particularmente se si utiliza a dosis elevadas; pero rara vez de más que de gemelos. Debe de emplearse con precaución en pacientes con fibromas uterinos, debido al riesgo de crecimiento de los mismos. Se interrumpe el tratamiento si se presentan alteraciones visuales y debe advertirse a la paciente de la incapacidad de conducir o manejar maquinaria.

Prenacin

Laboratorios Farsiman <laboratorios@farsiman.com>

http://www.laboratoriosfarsiman.com/index.php?view=property&id=11&option=com_hotproperty

Efectos Tóxicos

La terapia cíclica a largo plazo no está recomendada, a causa de la incertidumbre en lo que respecta al incremento de cáncer de ovario. El interés se centró en aquellas mujeres que estuvieron en tratamiento con clomifeno y gonadotropinas en 1 año o más; sin embargo las conclusiones de este estudio son provisionales, ya que el número de pacientes que presentaron cáncer de ovario fue reducido. A modo de precaución se sugiere una terapia de 6 ciclos durante el tratamiento con Clomifeno.

Presentación

Caja por 20 tabletas.

Laboratorios Farsiman

Honduras, C.A.

Marca: PRENACIN

Prenacin

Laboratorios Farsiman <laboratorios@farsiman.com>

http://www.laboratoriosfarsiman.com/index.php?view=property&id=11&option=com_hotproperty
